

# Pas de Piqûres, Pas d'écoles!



**Tous les enfants qui fréquenteront les écoles publiques, privées, ou paroissiales de D.C., doivent avoir leurs immunisations à jour, avant le commencement de la prochaine année scolaire.**

**Faisons immuniser à nouveau  
chaque enfant  
cette année**

**Appelez le médecin de votre enfant aujourd'hui pour demander  
au sujet des nouvelles piqûres qui pourraient être requises**



# Conditions d'immunisation pour l'année scolaire 2008 - 2009

Il y a de nouvelles immunisations exigées des enfants qui fréquentent les écoles ou les pouponnières dans le district de Columbia. Appelez le docteur de votre enfant pour vous enquerir au sujet des nouvelles immunisations qui pourraient être requises avant la rentrée des classes en Août 2008.

## Si votre enfant fréquente

### Les: Pouponnière, Jardin d'enfants ou Head start (age: 3 ans et moins)

#### Il/elle aura besoin de

- Vaccin anti-pneumocoque (doses appropriées pour les ages 1- 4 ans)
- Vaccin contre la varicelle
  - (1 dose au ou après le 1er anniversaire de naissance)
  - n'aura pas besoin, si le responsable des soins a diagnostiqué/vérifié qu'il y a eu varicelle

### Les classes de prématernelle (age: 4 ans)

#### Il/elle aura besoin de

- Vaccin anti-pneumocoque (4 doses)
- Vaccin contre la varicelle (2 doses)
  - 1ère dose au ou après le premier anniversaire
  - 2ème dose au moins 3 mois après la 1ère dose
  - N'aura pas besoin si le responsable des soins a diagnostiqué/vérifié qu'il y a eu varicelle

### Les classes de maternelle jusqu'aux classes de 5ème

#### Il/elle aura besoin de

- Vaccin anti-pneumocoque (4 doses)
  - N'aura pas besoin s'il/elle est agé de 5 ans et plus
- Vaccin contre la varicelle (2 doses)
  - 1ère dose au ou après le premier anniversaire
  - 2ème dose au moins 3 mois après la 1ère dose
  - N'aura pas besoin si le responsable des soins a diagnostiqué/vérifié qu'il y a eu varicelle

### Les classes de 6ème jusqu'aux classes de 12ème

#### Il/elle aura besoin de

- Vaccin contre la varicelle (2 doses)
  - 1ère dose au ou après le premier anniversaire
  - 2ème dose au moins 3 mois après la 1ère dose s'il/elle est age de moins de 13 ans; s'il/elle est age de 13 ans ou plus, 2ème dose 1 mois après la 1ère dose
  - N'aura pas besoin si le responsable des soins a diagnostiqué/vérifié qu'il y a eu varicelle.
- Tdap (tétanos, diphtérie, coqueluche)
- Dose de rappel 5 ans ont passe depuis la dernière dose de DTP/DTaP commençant à l'âge de 11 ans.

Les nouvelles immunisations sont ajoutées en addition à celles déjà requises:

- DTP/DtaP/Td
- Polio
- MMR (rougeole, oreillons, rubéole)
- Varicelle
- Hépatite B
- Hib

**Devancez la Ruée de la Rentrée des Classes  
Faites immuniser Votre Enfant Aujourd'hui  
Pas de piqûres, Pas d'écoles**