



BPHC, TB Clinic
BMC Yawkey Bldg, 3rd Floor
850 Harrison Ave.
Boston, MA 02118
(617) 534-4875

Medicação para a tuberculose

Isoniazid

(INH)

O que é?

Isoniazid (INH) (comprimidos de cor branca, redondos, de tamanho médio) é utilizado na prevenção e tratamento da tuberculose (TB).

Como devo tomar este medicamento?

Tome _____ comprimido (s) uma vez por dia, durante _____ meses.

- Não se esqueça de tomar os comprimidos.
- Tome o comprimido todos os dias à mesma hora, conforme indicado no frasco.
- Caso se esqueça de tomar o comprimido à hora habitual, tome-o assim que se lembrar.
- Não tome uma dose dupla de comprimidos para compensar a dose em falta.
- Não tome neutralizadores da acidez (tais como Maalox e Mylanta) 2 horas antes e 2 horas depois de tomar o comprimido.



Informe o seu médico/enfermeira do centro de consulta:

- Embora possa tomar este medicamento em segurança durante a gravidez, informe o centro de consulta caso esteja grávida ou a amamentar, ou caso esteja a pensar engravidar.
- Caso esteja a pensar tomar outros medicamentos.

Informações que devem ser comunicadas imediatamente ao centro de consulta:

Suspenda a medicação e telefone imediatamente para o centro de consulta, através do número (617) 534-4875, se apresentar algum dos sintomas seguintes:

- Comichão ou alergia na pele
- Dores de estômago ou problemas digestivos
- Manchas amarelas no branco do olho ou amarelecimento da pele
- Cansaço acentuado ou fraqueza
- Urina escura ou da cor da Coca-Cola
- Falta de apetite
- Febre
- Vômitos
- Sensação de formigueiro nas mãos ou nos pés
- Qualquer outro sintoma preocupante que pensa poder estar relacionado com a medicação



Importante:

- NÃO beba álcool (incluindo vinho, cerveja ou bebidas brancas) enquanto estiver a tomar este medicamento.
- Não tome acetaminophen (Tylenol) enquanto estiver a tomar este medicamento.

Ligue para o número (617) 534-4875 caso necessite de qualquer esclarecimento

Revisto em 3/05 (PORTUGUÊS)