



BPHC, TB Clinic
BMC Yawkey Bldg. 3rd Floor
850 Harrison Ave.
Boston, MA 02118
(617) 534-4875

治療肺結核的藥物

Rifampin

Rifampin 是什麼？

Rifampin（紅色膠囊）中文叫利肺寧，用於治療肺結核 (TB)。

如何服用此藥？

每次 _____ 片，每天一次，服 _____ 個月。

- 切勿忘記服用此藥。
- 遵照藥瓶上的指示，每天按時服藥。
- 如果忘記按時服藥，一旦記起，必須立即服用。
- 切勿爲了補吃而服用兩倍藥量。
- 在服用此藥前後的兩個小時內，切勿服用抗酸藥（例如 Maalox 和 Mylanta）。



告訴您的醫生/診所護士：

- 雖然此藥在懷孕期間服用是安全的，但是如果您懷孕了，或正在用母乳喂哺嬰兒，又或打算懷孕，請告訴 TB 診所。
- 如果您打算開始服用任何新藥。

若出現以下情況，必須立即告訴 TB 診所：

如果您出現以下症狀，必須停用此藥，立即撥打 (617) 534-4875，將情況告訴 TB 診所。

- 皮膚出疹或發癢
- 口腔或身體疼痛
- 眼白部分發黃或皮膚發黃
- 非常疲倦或虛弱
- 發燒
- 嘔吐
- 令您擔心的以及您認爲可能與服用此藥有關的任何情況



重要須知：

- 服用此藥期間，切勿喝酒，切勿服用 acetaminophen (Tylenol)。
- 如果您服用避孕藥、必須使用其他的避孕方式（例如使用避孕套），因爲 Rifampin 會影響避孕藥的功效，您可能會因此而懷孕。
- 您的小便、汗液、唾液和眼淚會變成紅色或橙黃色（這是正常的）。
- 軟性隱形眼鏡會永久性地變成橙黃色。
- 此藥可能會使您容易受到淤傷。

如果您有任何顧慮或疑問，請致電 (617) 534-4875

2005 年 1 月更新