



BPHC, TB Clinic
BMC Yawkey Bldg. 3rd Floor
850 Harrison Ave.
Boston, MA 02118
(617) 534-4875

Medicação para a tuberculose

Rifampin

O que é?

Rifampin (cápsulas vermelhas) é utilizado no tratamento da tuberculose (TB).

Como devo tomar este medicamento?

Tome _____ cápsula (s) uma vez por dia, durante _____ meses.

- Não se esqueça de tomar as cápsulas.
- Tome a cápsula todos os dias à mesma hora, conforme indicado no frasco.
- Caso se esqueça de tomar a cápsula à hora habitual, tome-a assim que se lembrar.
- Não tome uma dose dupla de cápsulas para compensar a dose em falta.
- Não tome neutralizadores da acidez (tais como Maalox e Mylanta) 2 horas antes e 2 horas depois de tomar a cápsula.



Informe o seu médico/enfermeira do centro de consulta:

- Embora possa tomar este medicamento em segurança durante a gravidez, informe o centro de consulta caso esteja grávida ou a amamentar, ou caso esteja a pensar engravidar.
- Caso esteja a pensar tomar outros medicamentos.

Informações que devem ser comunicadas imediatamente ao centro de consulta:

Suspenda a medicação e telefone imediatamente para o centro de consulta, através do número (617) 534-4875, se apresentar algum dos sintomas seguintes:

- Comichão ou alergia na pele
- Feridas na boca ou no corpo
- Manchas amarelas no branco do olho ou amarelecimento da pele
- Cansaço acentuado ou fraqueza
- Febre
- Vômitos
- Qualquer outro sintoma preocupante que pensa poder estar relacionado com a medicação



Importante:

- NÃO beba álcool nem tome acetaminophen (Tylenol) enquanto estiver a tomar este medicamento.**
- Se estiver a tomar a pílula anticoncepcional, utilize um método anticoncepcional adicional (por ex., o preservativo), uma vez que Rifater pode comprometer a acção da pílula, com uma possível gravidez como consequência.
- A sua urina, suor, saliva ou lágrimas poderão apresentar coloração vermelha ou laranja, o que é normal.
- As lentes de contacto gelatinosas poderão assumir uma coloração laranja permanente.
- Este medicamento poderá aumentar a sensibilidade à formação de hematomas.

Ligue para o número (617) 534-4875 caso necessite de qualquer esclarecimento

Revisto em 3/05 (PORTUGUÊS)