



BPHC, TB Clinic  
BMC Yawkey Bldg. 3<sup>rd</sup> Floor  
850 Harrison Ave.  
Boston, MA 02118  
(617) 534-4875

# Thuốc Trị Bệnh Lao

# Rifampin

## Thuốc này là gì?

Rifampin (dạng bao con nhộng màu đỏ) được dùng để chữa trị bệnh lao (TB).

## Dùng thuốc như thế nào?

Uống \_\_\_\_\_ viên mỗi ngày trong \_\_\_\_\_ tháng.

- **Đừng** quên uống thuốc.
- Uống thuốc cùng giờ mỗi ngày theo hướng dẫn trên lọ thuốc.
- Nếu quên uống thuốc đúng giờ, hãy uống ngay khi nhớ ra.
- **Đừng** uống gấp đôi để "bù lại" những lần quên uống thuốc.
- **Đừng** uống thuốc chống axit (như Maalox và Mylanta) trong vòng 2 tiếng đồng hồ trước khi và sau khi uống thuốc.



## Báo cho bác sĩ/y tá tại phòng mạch biết:

- Mặc dù thuốc này không gây hại cho thai nhi, xin yêu cầu quý vị báo cho phòng mạch biết nếu đang mang thai, có ý định mang thai, hoặc đang cho con bú sữa mẹ.
- Nếu quý vị dự định bắt đầu dùng bất cứ loại thuốc nào khác.

## Những điều nên báo ngay cho phòng mạch:

Hãy ngừng uống thuốc và gọi điện cho phòng mạch ngay tức khắc theo số (617) 534-4875 nếu quý vị bị một trong những triệu chứng sau đây.

- Phát ban hay ngứa ngoài da
- Lở loét trong miệng hay ngoài da
- Tròng trắng mắt hay da bị vàng
- Rất mệt hay yếu
- Sốt
- Ói mửa
- Bất cứ triệu chứng nào khác làm cho quý vị lo lắng và nghĩ rằng có thể do thuốc gây ra



## Quan Trọng:

- ĐỪNG uống rượu hay thuốc acetaminophen (Tylenol) trong khi dùng thuốc này.**
- Nếu quý vị uống thuốc viên ngừa thai, hãy dùng thêm một phương pháp ngừa thai khác nữa (như bao cao su) vì Rifampin có thể ảnh hưởng đến sự hiệu nghiệm của thuốc ngừa thai và quý vị có thể mang thai.**
- Nước tiểu, mồ hôi, nước bọt, và nước mắt của quý vị có thể đổi thành màu đỏ hay màu cam (điều này bình thường).
- Kính sát tròng mềm có thể đổi thành màu cam vĩnh viễn.
- Thuốc này có thể làm cho quý vị dễ bị bầm tím.

**\*\*\*Hãy gọi số (617) 534-4875 nếu có điều gì lo lắng hay thắc mắc\*\*\***

Được cập nhật hóa 1/05